

**EXTRAITS DES
JOURNAUX TENUS
POUR QUATRE-
VINGT-DEUX
MALADES QUI ONT...**

Pierre Jean Claude Mauduyt de La
Varenne



AVERTISSEMENT.

L'OUVRAGE que je publie, est le précis du compte que j'ai rendu à la Société Royale de Médecine du traitement électrique administré à quatre-vingt-deux malades. Ce compte, beaucoup plus étendu que je ne le donne aujourd'hui & plus détaillé, fera partie du second volume des Mémoires de la Société; mais cette Compagnie, après l'avoir entendu, a pensé qu'il seroit à propos d'en donner séparément un Précis. Elle a eu en vue les personnes qui, n'ayant que l'électricité pour objet, se trouveroient dispensées de l'acquisition du second volume qu'elle va publier: elle a voulu en même temps répondre aux demandes qui lui ont été assez souvent adressées par des Médecins de Province, qui, desirant employer l'électricité, & ne s'étant pas attachés particulièrement à cette partie de la Physique, l'ont consultée sur l'emploi mécanique & médical de

l'électricité. La Société a en même temps informé M le Directeur-Général des Finances des motifs qui lui faisoient desirer la publicité du Précis que je mets au jour : ce Ministre, qui a procuré les moyens d'exécuter les traitemens dont j'ai rendu compte, de continuer ceux qui ont lieu & d'entreprendre ceux qui se feront par la suite, a également procuré les deniers nécessaires pour l'impression de douze cents exemplaires du Précis qui paroît, & qui sera distribué gratuitement.

L'utilité de l'électricité dans la paralysie, annoncée depuis long-temps, plus reconnue chez les Étrangers qu'en France, où elle est encore douteuse pour bien des personnes, paroissant confirmée par les nouvelles expériences qui ont été faites, la Société Royale de Médecine desiroit appliquer le même remède à d'autres maladies, dans lesquelles l'électricité semble pouvoir être également utile, soit qu'on en juge d'après sa nature comme médicament, reconnue par ses effets, soit d'après quelques premiers traitemens, qui donnent de l'espérance.

Ces maladies sont le rhumatisme simple, s'il n'est pas très-invétéré, le rhumatisme goutteux, toutes les affections chroniques en général, qui dépendent de la transpiration supprimée; les suites de lait épanché, la goutte sereine & les écrouelles ou humeurs froides. Les personnes attaquées de cette dernière maladie, seront traitées séparément des autres malades. Enfin l'électricité que les Physiciens nomment positive, étant contraire aux personnes attaquées de maladies de nerfs & de tremblemens, il y a de la probabilité que l'électricité désignée sous le nom de négative, dont les effets sont l'opposé de ceux de l'électricité positive, pourroit leur être utile: un Physicien a même déjà annoncé avoir obtenu des succès par cette électricité dans les cas désignés. La Société Royale de Médecine a en conséquence désiré que je me procurasse une machine électrique négative. J'en ai fait construire une; elle est prête, & je rendrai compte par la suite des effets qu'elle aura produits dans les convulsions, les tremblemens & les maladies nerveuses en général. Je crois

(4)

pouvoir assurer que l'application de cette machine pour les cas spécifiés, n'est pas plus dangereuse que l'application de la machine positive, pour les cas dans lesquels on l'a employée, sans qu'il en ait résulté aucun inconvénient; & que ni l'une ni l'autre ne peuvent produire aucun mauvais effet, en s'en servant avec prudence.

Jx certifie que le présent Extrait a été lu dans les séances de la Société Royale de Médecine, & qu'il est en tout conforme à l'original contenu dans les registres de cette Compagnie, qui l'a jugé digne de son approbation. A Paris, ce 22 Novembre 1779.

Signé, VICQ D'AZYR, Secrétaire perpétuel.



LXV.....	368	Gallois (madame).....	371
LXVI.....	371		
LXVII.....	377	Malade (madame).....	377
LXVIII.....	380	Bourdet.....	380
LXIX.....	381		
LXX.....	384	Caron (madame).....	384
LXXI.....	385	Dauve.....	385
LXXII.....	390		
LXXIII.....	392		
LXXIV.....	392	Neuque chole.....	392
LXXV.....	393	Mouzon (mademoiselle).....	393
LXXVI.....	394	Dumont (madame).....	394
LXXVII.....	398	Bert.....	398
LXXIX.....	404	Chamoulaud.....	404
LXXX.....	405		
LXXXI.....	408		
LXXXIII.....	410		

*lades au bout d'un temps déterminé depuis la fin
du traitement.*

ans le même état qu'en cessant de venir,
igé au bout de dix-huit mois,
onze mois,
vingt-un mois,

ois après le traitement.
quinze mois,
en peu de jours & au bout de trois mois,
quatorze mois,
onze mois,

deux mois & demi après le traitement.

s après le traitement.

suit mois après,

e mois,



R É S U M É

*DU PREMIER MÉMOIRE SUR L'ÉLECTRICITÉ,
inséré dans le second Volume des Mémoires de
la Société Royale de Médecine.*

§. I^{er}.

P A R A L Y S I E S.

1°. De quatorze paralytiques qui ont suivi le traitement électrique aussi long-temps que je le leur ai conseillé, dix ont obtenu un soulagement marqué, quatre n'en ont éprouvé aucun : sur les dix premiers, sept en ont obtenu un très-considérable ; & sur ces sept, trois qui avoient une profession manuelle, ont été en état de la reprendre. (Voyez les n^{os} I, III, VII.)

2°. Des dix malades soulagés, neuf conservent jusqu'à présent ce qu'ils ont gagné ; une seule femme (n^o X) a perdu les trois quarts de ce qu'elle avoit acquis ; mais d'après l'histoire de sa maladie, il paroît que la perte qu'elle a soufferte, est moins un retour de la paralysie que l'effet d'un affoiblissement général de toute sa personne, produit par des

causes accidentelles, rapportées dans l'histoire de son traitement.

3°. Il est probable que la paralysie reconnoissoit pour causes le relâchement des fibres & une congestion humorale dans six des dix malades soulagés. (Voy. les nos *I, II, III, V, VIII, X.*) Elle étoit la suite d'une frayeur violente & subite dans le malade n° *IV*; elle paroissoit être celle de la pléthore sanguine dans la malade n° *VI*; celle d'une humeur portée d'abord à la peau & ensuite repertutée, dans le malade n° *IX*: rien n'éclaire sur la cause de la paralysie du malade n° *VII*.

4°. La paralysie datoit, dans deux des dix malades soulagés, de douze ans dans l'un (n° *V*), de trois ans & demi dans l'autre (n° *I*). Elle datoit de quinze mois dans le malade n° *III*; de treize, dans le malade n° *X*; de dix mois, dans celui n° *VII*; de trois mois & demi, dans le malade n° *VIII*, enfin d'un mois à six semaines dans les malades nos *II, IV, VI, IX*.

5°. Des dix malades, trois avoient passé cinquante ans; trois, quarante ans; deux, trente ans: les deux autres avoient, l'un, seize, l'autre, huit ans.

6°. Le traitement le plus long de ces dix malades a été de dix mois (voy. n° *X*); le plus court, de six semaines (voy. n° *IV*); le traitement moyen, de quatre à cinq mois.

7°. Deux des dix malades avoient fait usage des eaux thermales: elles les avoient soulagés; mais ils exerçoient des professions qu'ils n'avoient pas été en état de continuer, & qu'ils ont reprises depuis le traitement électrique. (Voy. les nos *I & III.*)

8°. La cause probable de la paralysie dans les trois premiers des quatre malades qui n'ont pas été soulagés, est dans l'un, l'épuisement, suite de l'excès auprès des femmes (voy. n° *XI*); dans l'autre, un vice scorbutique (n° *XII*); dans le troisième, un violent saisissement & de longs chagrins (n° *XIII*). Les symptômes éprouvés par le quatrième malade, & pris d'abord pour des menaces de paralysie, étoient des mouvemens spasmodiques (voy. n° *XIV*).

9°. De ces quatre malades, l'un passoit soixante ans, deux cinquante, & le quatrième avoit quarante-huit ans.

10°. Le malade n° *XIII* étoit sujet à de légères attaques d'épilepsie; celui n° *XIV*, à des mouvemens spasmodiques, qui ont été augmentés par l'effet de l'électricité, & rappelés peu de temps après sa cessation à leur intensité ordinaire. Le malade n° *I* étoit aussi sujet à des mouvemens épileptiques qui, dans celui-ci, ont été calmés, & qui ne s'étoient pas manifestés plus de six mois après la cessation du traitement.

§. I I. •

1°. DE vingt-huit paralytiques qui se sont retirés plus tôt que je ne le leur ai conseillé, mais dont le traitement a cependant duré plusieurs semaines, ou même un ou deux mois, vingt-un ont éprouvé pendant le traitement un soulagement marqué. De ces vingt-un malades, cinq avoient une profession manuelle, deux l'ont reprise & la continuent (voy. n°s *XV* & *XVI*); trois ont quitté au moment où ils ne faisoient encore que d'essayer à reprendre leurs travaux (voy. n°s *XVII*, *XX* & *XXXVII*); les seize autres n'avoient pas de métiers: ils ont obtenu un soulagement plus ou moins marqué, dans le rétablissement du mouvement de leurs membres paralytés. Ce soulagement les a mis, ou en état de marcher, ce qu'ils ne faisoient pas; ou de marcher plus aisément qu'auparavant; ou de se servir de leurs bras, dont ils ne faisoient pas usage, ou de s'en servir plus facilement. (Voy. n°s *XVIII* & *XIX*; & depuis & compris le n° *XXI* jusques & compris n° *XXXI*; & enfin les n°s *XXXVI*, *XXXVIII* & *XXXIX*.)

2°. Les deux malades qui ont repris leur état ou métier; le continuent depuis plusieurs mois (voy. n°s *XV* & *XVI*); des dix-neuf autres, treize conservent ce qu'ils avoient acquis depuis plus ou moins de temps que leur traitement est fini; quelques uns ont continué de faire des progrès durant un temps limité depuis la fin du traitement (v. n°s *XXI*, *XXIV*

& *XXV*) ; deux ont perdu un foible soulagement qu'ils avoient obtenu (voy. nos *XXVII* & *XXX*). Leur maladie étoit invétérée ; leur traitement a été beaucoup trop court. La malade n° *XXXVI*, après avoir conservé environ six mois le soulagement qu'elle avoit obtenu, est devenue hydropique : & enfin les malades nos *XXXVII*, *XXXVIII* & *XXXIX* sont morts, après avoir conservé pendant plus ou moins de temps ce qu'ils avoient acquis. J'en reparlerai dans un instant.

3°. Il paroît évident que la paralysie avoit été produite dans le malade n° *XV* par le reflux de l'humeur de la transpiration repercutée : il est probable qu'elle avoit été occasionnée dans le malade n° *XXXI* par une humeur rhumatisante ; dans le malade n° *XXVII* par une crise imparfaite à la suite de la petite-vérole ; & d'après le tempérament, la constitution, l'histoire des malades nos *XIX* & *XXIV*, il paroît que la paralysie avoit en eux pour causes le relâchement de la fibre & la congestion d'une humeur séreuse ou lymphatique, déposée sur les organes qui servent aux mouvemens. Ces cinq malades ont été soulagés : celui n° *XV* l'a été beaucoup, celui n° *XXXI* fort peu ; le malade n° *XIX* l'a été considérablement, celui n° *XXIV* moins que le précédent : tous quatre conservent ce qu'ils avoient obtenu. Le malade n° *XXVII* a peu gagné, a suivi peu de temps & a perdu le peu qu'il avoit acquis. Rien n'indique de causes particulières auxquelles on puisse rapporter avec fondement la cause de la paralysie dans les seize autres malades, qui ont été soulagés.

4°. La paralytique n° *XXVII* l'étoit depuis huit ans & demi. Malgré un temps aussi long, quoiqu'elle ait suivi peu de temps, qu'elle ait peu gagné & perdu le peu qu'elle avoit acquis, son traitement prouve que l'électricité a eu sur elle un effet salutaire, & qu'on en pouvoit attendre avec le temps un plus considérable & plus durable.

Le mal datoit de six ans dans le malade n° *XXII* ; de quatre ans & demi dans celui n° *XXVIII* ; de quatre dans celui

celui n° XXX. Les deux premiers ont conservé ce qu'ils avoient acquis ; le troisième a peu gagné : il a perdu du côté du bras, conservé du côté de la jambe le gain qu'il avoit fait.

Le malade n° XX étoit paralytique depuis trois ans ; il a peu suivi, & cependant il a gagné assez pour essayer de commencer à reprendre son métier.

Les malades n°s XXIII & XXIX étoient affectés, l'un depuis un an, l'autre depuis deux : tous deux ont gagné & conservé ce qu'ils avoient acquis.

Les malades n°s XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI & XXIV, qui ont en général gagné le plus, n'étoient affectés que depuis quinze jours à six semaines, en prenant les extrêmes des dates de leur maladie : les autres, dont je ne parle pas en particulier, l'étoient depuis trois à six mois environ.

5°. Des vingt-un paralytiques qui ont été soulagés, l'un, n° XXXVII, avoit soixante-treize ans ; l'autre, n° XXV, soixante-onze ; le troisième, n° XVIII, soixante-huit ; cinq, n°s XXI, XXVIII, XXXI, XXXVI, XXXVIII, avoient soixante ans & plus ; un seul, n° XV, avoit cinquante à soixante ans ; quatre, n°s XIX, XXIII, XXIV, XXX, avoient de quarante à cinquante ans ; trois, n°s XVI, XVII, XXVI, étoient âgés de trente ans passés ; deux, n°s XX & XXVII, étoient entre vingt & trente ans ; trois enfin, n°s XXII, XXIX & XXXIX, étoient des enfans au dessous de sept ans.

6°. Le traitement le plus long des vingt-un malades précédens a été d'environ cinq mois ; le plus court, d'un mois, & le traitement moyen, de trois mois.

7°. Sept autres malades, qui se sont également retirés plus tôt que je ne le leur ai conseillé, & dont le traitement a cependant duré à peu près dans la proportion des vingt-un précédens, n'en ont retiré aucun avantage. (V. n°s XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XL, XLI, XLII.) La cause de la paralysie paroît être dans la malade n° XXXII,

un dérangement d'organisation ; dans la malade n° XXXIII, une métastase à la suite d'une fièvre maligne : il est incertain que la maladie de la personne désignée n° XXXV, soit vraiment une paralysie ; aucun indice ne désigne de causes particulières du mal dans les quatre autres paralytiques ; il n'étoit pas plus invétéré dans ces sept malades que dans les vingt-un qui ont été soulagés.

8°. Des vingt huit paralytiques dont je viens de parler, vingt-un n'avoient pas eu de maladie depuis la fin de leur traitement jusqu'au jour où j'ai rédigé leur article : il y en avoir dont le traitement étoit fini depuis dix-huit mois & davantage , & le plus récent datoit de deux mois.

Des sept autres paralytiques, une femme âgée de soixante-cinq ans (n° XXXVI), après avoir été en bonne santé pendant quatre ou cinq mois à la suite du traitement, étoit devenue hydropique.

Le malade n° XXXVII, âgé de soixante-treize ans, qui n'avoit pris que vingt-une séances, après avoir continué à la suite de son traitement, de sortir & de se promener pendant trois à quatre mois, fut arrêté par une maladie qui le retint d'abord chez lui, & qui l'ayant ensuite obligé de garder long-temps le lit, termina ses jours environ huit mois après le traitement ; ayant passé les quatre premiers sans incommodité. Je n'ai pu avoir de renseignemens sur la nature de la maladie dont il est mort.

Le paralytique n° XXXVIII, âgé d'environ soixante ans ; ne prit que quinze séances : il est mort un an environ après son traitement. M. Cofnier, docteur-régent de la faculté & médecin du malade, m'a fourni les faits qui le concernent. Il conserva pendant neuf mois la liberté des mouvemens ; la netteté des idées & la bonne santé qu'il avoit recouvrées ; il dépérit ensuite & mourut au bout de trois mois, sans avoir perdu la liberté des mouvemens qu'il avoit acquise, sans avoir éprouvé de maladie marquée, mais d'épuisement & des suites d'un mauvais régime.

Le malade n° XXXIX, âgé de trois ans & demi, prit

vingt-une séances : son traitement eut lieu pendant l'automne. Un rhûme qui lui survint & la mauvaife saison empêchèrent de continuer ; trois mois passés après sa retraite, il éprouva des convulsions dont il mourut.

Le paralytique n° *XL*, âgé de soixante-six ans, ayant été électrisé sans aucun succès pendant trois mois & demi, eut une nouvelle attaque sept jours après sa retraite. Il fut traité par les moyens ordinaires, qui le soulagèrent, & malgré la continuité de ces remèdes, il éprouva pendant leur usage une troisième attaque dont il mourut.

Le malade n° *XLI*, âgé de cinquante-cinq ans, avoit eu antérieurement deux attaques d'apoplexie & de paralysie dans lesquelles il avoit été traité par un médecin de la faculté de Paris. Il ne prit que dix-sept séances, qui ne furent suivies d'aucun effet. Au bout de six mois après le traitement, passés sans accident, le malade eut une troisième attaque, à laquelle il succomba.

Enfin le paralytique n° *XLII*, âgé de soixante-quatre ans, malade depuis quatre, ayant les jambes fort enflées, & qui avoit eu antérieurement deux attaques fort vives de goutte, fut électrisé pendant un mois. Il n'y eut d'autre effet que la diminution de l'enflure. Ce malade s'étant retiré à Passy, y mourut d'hydropisie dix-neuf jours après la fin de son traitement, suivant le rapport de M. Dufaulx, chirurgien qui l'a soigné pendant sa dernière maladie.

§. III.

1°. NEUF paralytiques se sont retirés très-peu de temps après s'être présentés; quatre ont cependant éprouvé des effets marqués (voyez n°s *XLIII*, *XLIV*, *XLV*, *LI*) : la tentative que les cinq autres ont faite, a été totalement inutile.

La malade n° *XLIV*, âgée de trente-huit ans, étoit paralytique depuis trois. Quoiqu'elle n'ait pris que onze séances, elle a éprouvé un soulagement très-marqué, & dix

mois après le traitement fini , elle étoit dans le même état qu'en le quittant. Les deux enfans n^{os} *XLV* & *XLVI*, & le paralytique n^o *XLVII* se portoient bien , le premier dix-huit mois , le second onze , & le troisième vingt-un mois après le traitement fini. Les autres avoient pris si peu de séances & des séances si courtes , que j'ai cru inutile de m'informer de leur état depuis leur retraite. Quoique l'enfant n^o *XLV* n'eût pris que onze séances , elles avoient produit un effet bien marqué , qui se soutenoit un mois après le traitement fini. Je n'ai pu savoir s'il continuoît , dans le moment où j'écris , dix-huit mois après ce traitement fini , parce que l'enfant & ses parens étoient à la campagne , & que je n'ai eu des nouvelles de sa santé en général que par un domestique.

STUPEURS , ENGOURDISSEMENTS.

2^o. Cinq malades ont été électrisés pour un engourdissement partiel , ou général. Quatre n'ont éprouvé aucun effet quelconque ; le cinquième (n^o *LIV*) avoit les nerfs fort affectés , & l'électricité en augmenta l'agacement : mais cet effet n'eut point de suite. Le traitement le plus long avoit été de deux mois dix jours ; le plus court , de onze séances. Les cinq malades étoient toujours dans le même état long-temps après le traitement fini & en prenant les extrêmes , l'un (n^o *LII*) dix-sept mois , l'autre (n^o *LIV*) trois mois , après leur retraite.

RHUMATISMES.

3^o. De deux malades traités pour causes de rhumatisme ; l'un (n^o *LVII*) âgé de quarante-neuf ans , affecté depuis dix-sept jours seulement de douleurs aiguës , qui le privoient de l'usage de son bras , ne prend que douze séances : elles dissipent les douleurs ; le malade reprend son métier , & deux mois & demi après le traitement , il n'avoit ressenti aucune atteinte de son mal.

L'autre malade (n° *LVIII*) étoit une femme âgée de soixante-trois ans, incommodée de rhumatismes depuis vingt-deux. Elle éprouva d'abord un soulagement assez marqué ; mais il ne se soutint pas même pendant le traitement, qui fut de plus de six mois, & les douleurs, de fixes & can-tonnées qu'elles étoient dans certaines parties avant le traitement, devinrent vagues pendant qu'il eut lieu. Ce dernier état duroit treize mois après.

RHUMATISMES GOUTTEUX.

4°. SIX malades traités pour cause de rhumatisme goutteux, éprouvent tous des effets très-marqués. Le premier (n° *LIX*), âgé de trente-huit ans, hors d'état de travailler depuis neuf mois, électrisé pendant deux & demi, reprend son métier, qui est celui de cordonnier, & le continuoit, sans l'avoir interrompu depuis, dix-huit mois après le traitement fini.

Le second (n° *LX*), âgé de trente-sept ans, incommodé depuis deux, est soulagé, quoiqu'il n'ait pris que dix séances.

Le troisième (n° *LXI*), dont j'ignore précisément l'âge, qui m'a paru entre quarante-cinq & cinquante ans, incommodé depuis vingt-deux, ne prend que vingt-cinq séances à des distances éloignées ; il éprouve un léger soulagement. Je m'informe de son état au bout d'un an, & je n'en suis pas instruit, parce que le malade est dans ses terres.

Le nommé Antoine (n° *LXIII*), âgé de trente ans ; incommodé depuis sept mois, ayant beaucoup de peine à marcher, privé de la sensibilité aux deux jambes & du mouvement à un pied, antérieurement sujet à d'abondantes sueurs qui sont supprimées depuis sa maladie, recouvre en peu de temps la sensibilité & le mouvement ; les sueurs supprimées se rétablissent en fort peu de jours : le malade marche plus aisément au bout d'un mois. Son traitement dure encore & les progrès en bien augmentent.

Le malade n° *LXIV*, âgé de quarante ans, incommodé depuis trois & demi, affecté d'un froid continu & violent,

sujet à des spasmes, ne prend que cinq séances : elles rappellent chaque fois la chaleur naturelle, qui se soutient pendant quelques heures : les spasmes sont augmentés & sont abandonner l'électricité ; ils se calment peu après, & l'ancien état étoit le même deux ans après le traitement.

Il est très-probable que la transpiration supprimée & répercurée étoit la cause du mal dans les malades n^{os} *LXI*, *LXIII* & *LXIV*. On ne peut former aucune conjecture particulière & fondée sur le principe du mal, par rapport au malade n^o *LIX* & par rapport à celui n^o *LXII*, dont il me reste à parler.

Ce dernier mérite une attention particulière : âgé de trente-huit ans, il étoit incommodé depuis cinq. Sa maladie étoit très-grave ; elle consistoit dans une surdité absolue, une foiblesse extrême & l'amaigrissement des extrémités inférieures, le gonflement d'un poignet, son défaut de mouvement, ainsi que des doigts de la main du même côté, le dépérissement de toute la personne. Le malade électrisé pendant quatre mois, a d'abord éprouvé un mieux marqué ; il a entendu quelques sons, ses jambes ont été moins foibles, son poignet & ses doigts ont acquis du mouvement : il s'est établi en même temps une crise longue & abondante par les urines ; elle a consisté en une grande quantité de glaires & une matière terreuse. Malgré l'espoir que cette crise pouvoit inspirer, le mieux n'a pas augmenté ; l'enflure du poignet a passé dans les doigts, il s'est établi au poignet des douleurs qui n'ont pu être calmées ; enfin la crise par les urines s'est ralentie, elle s'est supprimée sans qu'on ait pu la rappeler ; les douleurs du poignet sont devenues insupportables ; on a craint pour la poitrine, qui a paru s'échauffer : on a renvoyé le malade, en lui conseillant l'usage du lait, auquel on l'avoit déjà mis. Il ne l'a pas continué ; & après trois mois environ, pendant lesquels il eut de violentes & fréquentes quintes de toux, suivies de crachemens de sang, il a succombé à ses maux.

L A I T É P A N C H É.

5°. DEUX femmes ont été électrisées pour les suites d'un lait épanché. L'une (n° *LXV*), âgée de vingt-cinq à vingt-huit ans, forte, bien constituée, ayant toujours joui d'une bonne santé, après six mois de maladie, fort vive d'abord & de langueur ensuite, souffroit encore beaucoup, ne pouvoit plier la jambe, marchoit avec peine, & étoit en grande partie privée de l'évacuation périodique. Elle fut électrisée deux mois & demi, soulagée en très-peu de temps & totalement rétablie en six semaines, à l'exception de l'enflure ou œdème de la jambe, que l'électricité ne dissipa pas. Cette dame jouissoit d'une santé parfaite sept mois après le traitement, sans avoir ressenti dans cet intervalle aucune atteinte de ses maux passés.

L'autre malade (n° *LXVI*), âgée de trente-quatre ans; d'une complexion foible & délicate, incommodée depuis dix mois, ne prit que soixante-quinze séances en onze mois. Elle avoit, en se présentant, les doigts fermés & inextensibles, le poignet courbé, la vue voilée, les jambes extrêmement foibles. Sa vue étoit habituellement nette, ses doigts s'ouvroient, mais sans qu'elle les refermât à volonté; son poignet étoit redressé, ses jambes étoient moins foibles quand elle se retira. Elle commençoit à s'aider de sa main & à faire dans son ménage différentes choses qui lui étoient antérieurement impossibles : mais sur la fin, l'électricité lui occasionnoit des douleurs qui ont empêché de la continuer, soit que ces douleurs fussent aussi vives que la malade le disoit, ou qu'elle manquât de courage. On eût peut-être pu les apaiser, en employant des calmans en même temps que l'électricité ; mais la malade négligea ce moyen, qui lui fut conseillé. Un mois après son traitement fini, elle conservoit ce qu'elle avoit gagné, quoique depuis trois mois elle eût pris très-peu de séances; & les douleurs étoient calmées, ou au moins très-diminuées.

S U R D I T É S.

6°. De dix sourds, six ont été électrisés pendant un temps assez long, & ont été plus ou moins soulagés; un septième l'a été beaucoup, quoiqu'il n'ait suivi le traitement que peu de temps; trois, dont deux (n^{os} LXXIV & LXXV) n'ont pris que huit séances, n'en ont éprouvé aucun effet; le troisième (n^o LXXIII), qui a pris trente-une séances, n'en a retiré aucun avantage, mais sa surdité datoit de vingt-huit ans.

Des six sourds qui ont été soulagés, le premier (n^o LXVII) étoit une femme âgée de vingt-six ans; elle étoit sourde depuis cinq: sa surdité avoit été beaucoup augmentée par un lait épanché; les autres symptômes produits par cet accident avoient été dissipés par les moyens ordinaires, ils n'avoient nullement remédié à la surdité, ils n'avoient pas non plus dissipé l'engorgement d'une glande au sein, qui étoit de la grosseur d'une noisette. La personne incommodée prit quarante-six séances électriques: la glande s'applatit, & on la trouvoit à peine en la cherchant avec soin. Il falloit au commencement parler très-haut à la malade; elle entendoit à la fin du traitement, en lui parlant du ton ordinaire, & elle distinguoit à onze pouces de distance le battement de sa montre, qu'elle ne discernoit qu'à deux pouces en se présentant. Cependant elle avoit encore l'ouïe dure, & étoit dans le cas de continuer, si des douleurs qui se faisoient sentir au sein à la suite des dernières séances, & l'abondance des règles trop fortes à la dernière époque, n'eussent été des motifs de cesser le traitement. Cette personne a encore été soulagée de différens symptômes dont on peut prendre connoissance en lisant l'article qui la concerne. Elle n'avoit rien perdu au bout d'un mois.

Le second malade (n^o LXVIII), âgé de quarante-un ans, étoit sourd d'une oreille depuis douze ans, de l'autre, depuis trois. Le premier accident étoit arrivé à la suite de la

la petite-vérole ; le second , à la suite d'une fièvre maligne. Il n'entendoit rien qu'autant qu'on crioit très-haut & très-près de lui : il ne prit que vingt-quatre séances, interrompues par des intervalles très-longes , & se retira entendant bien les personnes qui lui parloient d'un ton de voix ordinaire à trois pieds de distance , soit qu'elles se tinssent devant ou derrière lui, ou de côté. Il n'avoit rien perdu au bout de six semaines.

Le troisième (n° *LXIX*) , âgé d'environ cinquante ans, sourd depuis sept, très-probablement par la suppression d'une excrétion critique à laquelle il étoit antérieurement sujet, & qui n'avoit pas eu lieu depuis sept ans, prit quarante séances. Il éprouva un changement notable, très-indiqué par la distance à laquelle il entendoit sa montre & par la manière dont on conversoit avec lui : enfin la crise à laquelle il avoit été sujet, se rétablit pour la première fois depuis sept ans. Il sentoit l'espérance que ces premiers succès pouvoient suggérer, quand les allégations d'un antagoniste de l'électricité le déterminèrent à la quitter, malgré les représentations de son médecin ordinaire & à mon grand regret.

Le quatrième (n° *LXX*) est une femme âgée de trente-neuf ans, sourde depuis neuf. Elle n'entendoit que par le moyen d'un cornet. La cause de sa maladie est absolument inconnue : elle a été électrisée pendant neuf mois ; l'avantage qu'elle en a retiré, se borne à entendre sans cornet lorsqu'on élève la voix très-haut : elle est toujours très-sourde, & cependant elle l'est un peu moins que lorsqu'elle se présenta. Elle conservoit au bout de quatre mois le peu qu'elle avoit acquis.

M. Daure, officier invalide (n° *LXXI*) âgé de quarante-huit ans, sourd depuis douze ans, d'abord foiblement, & excessivement depuis dix-huit mois, ne put distinguer ce que je lui disois le premier jour qu'il se présenta ; il n'entendoit aucun bruit dans le réfectoire des invalides au moment des repas. Il a suivi l'électricité pendant huit mois. Il étoit parvenu à converser avec deux personnes, placé entre elles à deux à trois pieds de distance ; il discernoit les différentes

sortes de bruits qui se font dans le réfectoire où il prend ses repas. Il conserva peu de temps ces avantages, qui ont beaucoup diminué ; il lui en restoit cependant encore quelque chose quatre mois après son traitement, quoiqu'il crût avoir tout perdu & que ses amis le pensassent. Il est même incertain s'il avoit tout perdu au bout de quatorze mois. On a en général exagéré ses succès & la perte qu'il a faite.

Le malade n° LXXII, âgé de quarante-huit ans, étoit sourd depuis vingt-trois ; sa surdité paroissoit due à de fréquentes fluxions. Il a suivi l'électricité pendant quatre mois : il en a retiré pendant le traitement un avantage assez marqué, mais il ne s'est pas soutenu. Je le vis dix mois après le traitement, & je le trouvai au même degré que le premier jour où je l'avois connu. Il m'assura cependant qu'il lui restoit deux choses acquises pendant l'électrification : la première, d'être plus sensible aux bruits un peu forts ; la seconde, d'avoir, moins fréquemment que par le passé, des jours où il se trouve plus sourd que les autres.

MALADIES DES YEUX.

7°. J'ai traité trois malades pour causes de goutte seresine. Le premier (n° LXXVI), âgé de quarante ans, ne discernoit pas depuis trois mois la lumière la plus vive des ténèbres les plus profondes. Traité pendant deux mois & demi, il parvint, au bout de deux, à distinguer assez bien les couleurs, à discerner quelques objets. Il suspendit mal à propos son traitement à cette époque, pendant six à sept jours. Il perdit ce qu'il avoit acquis ; il le regagna au bout de deux jours qu'il eût repris le traitement. Quoiqu'il le continuât, il perdit beaucoup ; il se découragea, & refusa de continuer. Six semaines après, il étoit plongé dans les mêmes ténèbres qu'avant le traitement, & son état n'avoit pas changé vingt-deux mois après.

Le second malade (n° LXXVII) étoit une femme de cinquante ans : elle n'avoit qu'un œil d'affecté & qui n'étoit pas entièrement perdu. Elle suivit le traitement pendant

deux mois, en retira un foible avantage, ne continua pas, & elle étoit, un an après le traitement, dans le même état qu'en le quittant.

Quoique le malade n° *LXXVIII*, dont la maladie datoit d'un an, & qui distinguoit à peine le jour de la nuit, n'ait pris que dix-huit séances, elles produisirent sur lui un effet qui pouvoit donner de l'espérance; mais il quitta sous de vains prétextes. J'ai rapporté dans son article un traitement & une guérison d'une goutte sercine, par M. de Sauffure.

Le malade n° *LXXIX*, privé d'un oeil & incommodé de taches sur l'autre, qui lui paroissoient voltiger entre l'oeil & les objets, fut électrisé sans aucun effet pendant trois mois & demi, & sans que son état eût changé en rien huit mois après le traitement.

SUPPRESSION ET DÉFAUT DE RÈGLES.

8°. JE n'ai traité que deux femmes pour cause de suppression de leurs règles : l'une (n° *LXXX*) âgée de dix-sept ans & demi, incommodée depuis dix-huit mois, & affectée, outre la suppression, de mouvemens spasmodiques, dont le retour étoit périodique. Ses règles ont été rappellées au bout de quatre séances, & n'avoient pas manqué à chaque époque, au bout d'environ deux ans. Quant aux mouvemens spasmodiques, ils n'avoient pas eu lieu pendant les six mois qui avoient suivi le traitement, mais ils s'étoient renouvelés ensuite, & ils étoient devenus les mêmes qu'avant le traitement, quant à la fréquence, la durée & le degré de force.

La seconde malade (n° *LXXXI*) n'avoit que quinze ans & demi. Une frayeur subite au moment de l'évacuation périodique, l'arrêta, & les remèdes administrés en grand nombre par deux habiles médecins, n'avoient pu la rappeler en un an. La jeune personne étoit au premier degré de la cachexie, & sujette à des vapeurs hystériques. Elle fut électrisée trois mois de suite, environ quinze à vingt jours chaque mois. Le premier, elle vit abondamment en blanc, moins copieusement le second, & moins encore le troisième : les

mouvemens hystériques furent un peu apaisés, l'appétit & les digestions furent un peu meilleures. On tenta après l'électricité quelques remèdes qui furent inutiles : on n'en fit ensuite aucun, & environ six mois après l'évacuation se rétablit, les forces se réparèrent ; la malade prit beaucoup d'embonpoint & jouissoit de la plus parfaite santé dix-sept mois après son traitement.

Enfin une demoiselle (n° *LXXXII*) âgée de vingt-deux ans, qui n'avoit point encore éprouvé l'évacuation ordinaire à toutes les femmes, sujette à des suffocations & des resserremens de la gorge, en bonne santé d'ailleurs, fut électrisée pendant deux mois sans qu'il arrivât aucun changement dans son état, qui étoit le même au bout d'un an révolu.

Ces trois faits sont fort peu probatoires, excepté le premier : comme il est unique, il le seroit peu lui-même ; mais on doit y joindre, relativement à la suppression, les malades n°s *V* & *LXV*, soulagées à cet égard, quoique traitées en même temps pour une autre cause : & je dois prévenir encore que dans toutes les femmes qui ont été électrisées, les mois ont constamment devancé, qu'ils ont été plus abondans & que cet effet même, qui demande de l'attention, est un obstacle à ce qu'on emploie, pour les femmes dans le cas d'être électrisées, un traitement aussi actif que pour les hommes en général, ou pour les femmes qui ont passé l'âge critique.

Ce seroit le lieu de conclure en cet endroit, relativement à l'utilité ou l'inutilité de l'électricité en général, en particulier relativement à l'usage qu'on en peut faire dans la paralysie, & d'examiner quelles sont les espèces de cette maladie auxquelles elle peut le mieux convenir. Mais je m'abstiendrai d'exposer mon sentiment sur ces objets, dont je remets & dont j'abandonne absolument la décision aux médecins, à qui seuls elle appartient, & qui prononceront, soit d'après les faits que j'ai rapportés, soit d'après ceux qui ont été annoncés dans les différens écrits rendus publics. Si mes confrères regardent l'électricité comme utile, ils la

prescriront ; & si les faits se multiplient & se perpétuent en sa faveur , elle sera pour jamais mise au rang des remèdes , malgré les déclamations & les efforts de ses antagonistes : si les médecins au contraire jugent que l'électricité est inutile , ils ne la conseilleront pas , & quand on l'emploieroit contre leur avis , si elle ne rend pas à l'humanité des services réels & soutenus , elle tombera dans l'oubli , malgré les stériles éloges de ses panégyristes. Car les hommes peuvent bien d'abord être séduits par les clameurs de l'ignorance ou les trames du vil intérêt ; mais ils reviennent à la longue de leur erreur , & ils adoptent à la fin pour toujours ce qu'ils avoient d'abord rejeté , s'il leur est en effet utile , comme ils rejettent à jamais ce dont ils avoient fait le plus de cas , s'ils n'en retirent pas d'avantage. Le temps & l'expérience décideront donc — de la juste valeur de l'électricité , comme ils réduisent toutes choses à leur véritable prix.

Quant à moi , je ne me suis chargé que de rapporter les faits ; je m'en suis acquitté avec autant d'exactitude & de vérité qu'il m'a été possible ; s'il s'est glissé quelque erreur dans mon récit , elle est absolument involontaire. Cependant je ne doute pas que je n'éprouve deux sortes de critiques. Les enthousiastes de l'électricité me taxeront d'en avoir diminué les effets , ou de l'avoir mal employée ; ses antagonistes , d'avoir exagéré. Des censeurs d'une troisième espèce (car j'en ai déjà rencontré) , conviendront que j'ai parlé de bonne foi , que j'ai rapporté les faits comme ils m'ont paru se passer , mais que j'ai vu les choses autrement qu'elles ne sont arrivées. S'il s'agissoit de discuter des matières purement soumises au raisonnement , je ne réclamerais pas ; je fais combien il est aisé de se tromper : mais je parle de faits soumis au jugement des sens : comment puis-je donc m'être égaré ? Qu'un homme ne marchât pas , qu'il ne pût se servir de son bras , qu'il ait marché & repris son métier , comment puis-je m'en être imposé sur de pareils faits ? De ce qu'ils ont eu lieu pendant un traitement quelconque , qu'on n'en conclue pas

qu'ils en soient l'effet ; je ne réponds rien , je laisse aux autres à juger & à prononcer : mais ce raisonnement peut être fait à l'occasion de tout remède quelconque ; qu'on prenne garde à l'inaction & aux doutes où son application nous jetteroit sur tous les objets de médecine.

Une autre imputation plus grave dont je crois devoir parler, parce qu'elle pourroit nuire au jugement que les lecteurs porteront , & me faire soupçonner de réticence, est la suivante. Un ecclésiastique m'écrivit une lettre très-pressante, par laquelle il me sollicita à l'aller voir ; je me rends chez lui, je l'écoute, je l'observe. D'après son récit & l'examen que je fais de son état, je lui déclare que je le trouve dans un cas favorable ; que la date récente de sa maladie, son degré, sa nature, les forces qu'il conserve intactes dans un âge qui commence à s'avancer, sont autant de présomptions qui me font bien augurer pour lui de l'usage de l'électricité. Je le quitte : je ne l'ai jamais revu, il ne m'a jamais consulté depuis ; j'ignore s'il a été électrisé ; & supposé qu'il l'ait été, comment, combien de temps & par qui. J'apprends cependant qu'il publie (& je l'apprends d'un de mes confrères à qui il l'a dit) qu'il s'est mis entre mes mains, que je lui ai promis les plus grands avantages, qu'il n'en a retiré aucun. On jugera d'après le fait, si cet ecclésiastique a été entre mes mains : quant aux promesses qu'il prétend que je lui ai faites, je lui opposerai, & les malades que j'ai traités, & le nombre beaucoup plus grand de ceux qui m'ont consultés. Tous me rendront la justice de ne leur avoir jamais proposé le traitement électrique que comme une tentative sans danger, en se conduisant prudemment, en faveur de laquelle il y avoit des présomptions.

Dans une province où les secours que la nature fournit invitent tous les ans un grand nombre de paralytiques à s'y rendre, un homme qui se dit médecin, qui peut en avoir des lettres, mais qui n'en a pas le caractère, débite devant les paralytiques, « qu'il a suivi à Paris pendant l'hiver

» précédent, les traitemens électriques que j'y ai faits, que
 » non-seulement ils n'ont rien produit d'avantageux, mais
 » qu'il en a résulté de grands accidens ». Je n'ai jamais vu
 ce soi-disant médecin ; je le défie de dire comment je suis
 fait, à moins qu'il ne le sache par récit ; s'il eût suivi mes
 malades, son nom seroit sur leurs journaux. qu'il auroit
 signés, ou, s'il eût refusé de le faire, il pourroit citer des
 témoins de son refus, il pourroit nommer quelqu'un qui
 l'eût vu chez moi. Je le défie de l'un & de l'autre. Son
 but est plus aisé à pénétrer que celui de l'ecclésiastique dont
 je viens de parler. Un médecin du même lieu avoit en
 effet passé l'hiver à Paris ; il avoit suivi fréquemment les
 traitemens électriques ; prêt à partir, il envoya chez lui
 une machine, dans le dessein d'employer en même temps
 pour un certain nombre de malades, l'électricité & les se-
 cours que la nature fournit dans la province qu'il habite ;
 il vouloit observer si ces deux moyens réunis en seroient
 plus puissans ; cela pouvoir arriver, & les conséquences
 sont faciles à déduire. Le mensonge les prévint, aucun
 des paralytiques ne voulut s'approcher de la machine élec-
 trique, excepté une dame de condition à laquelle M. le
 duc de Penthièvre prenoit beaucoup d'intérêt, & pour
 laquelle ce prince m'avoit fait l'honneur de me consulter.
 Cette dame fit usage pendant quelques jours des eaux prises
 sur-le lieu, & en même temps de l'électricité ; elle conti-
 nua ce double emploi à son retour à Paris, pendant trois
 semaines environ, sans en éprouver de succès ; mais j'en
 avois peu attendu, supposé qu'on en obtint ; j'en avois
 prévenu le prince qui prenoit intérêt à la malade, &
 M. Maloët, son Médecin ordinaire.

Indépendamment des quatre-vingt-deux malades dont
 j'ai parlé, j'en ai traité ou j'en traite d'autres. Je ne rap-
 porte pas le traitement, ou parce qu'il est trop récent, ou
 parce qu'ils le suivent encore. De ce nombre est un jeune
 homme de vingt ans, paralytique du bras droit depuis
 quinze ; ce malade, dont les doigts étoient fermés & inex-

renfibles, le poignet courbé & fans mouvement, commence à se servir de sa main à quelques légers usages. Les succès ont été très-rapides d'abord, & sont lents à présent; mais il n'est pas exact. J'ignore jusqu'où je pourrai le conduire, & j'en rendrai compte par la suite. J'en parle à cause du rapport qu'il a avec la malade n° *XXVII*, devenue également paralytique à la suite de la petite-vérole.

Enfin une jeune enfant, âgée de six ans, me fut présentée il y a sept semaines; elle avoit depuis trois mois des glandes engorgées aux deux côtés du cou; la parotide gauche devenue de la grosseur d'un petit œuf, avoit absqué; il s'étoit formé un ulcère de la largeur d'un écu de trois livres; les bords en étoient épais, élevés, calleux, & renversés; les chairs du fond étoient fongueuses; il rendoit en petite quantité un pus grisâtre. On avoit employé inutilement des cataplasmes, le emplâtre de dyachylum gommé, & prescrit à l'intérieur des bols faits avec l'aquila alba, la gomme ammoniac & la résine de gaïac. Le mal augmentoit au lieu de diminuer; il m'a paru, ainsi qu'au chirurgien qui soignoit l'enfant, dépendre d'un vice écrouelleux; c'est aussi, au rapport du chirurgien, le sentiment d'un de mes confrères qu'on avoit consulté avant moi. Les glandes & la parotide même sont aujourd'hui à très-peu de chose près, désobstruées, & l'ulcère est très-prêt d'être cicatrifié. J'ai fait continuer pendant l'électricité les bols dont on usoit auparavant, & qui jusqu'au nouveau traitement, n'avoient pas produit d'effet. Quoique je pense depuis long-temps que le fluide électrique, d'après les propriétés qu'il me paroît avoir, convienne beaucoup dans le cas des écrouelles, je ne prétends pas citer l'observation précédente comme une preuve suffisante de mon sentiment: je la rapporte seulement comme une présomption favorable; je désirerois la vérifier, en traitant des personnes attaquées d'écrouelles; c'est depuis long-temps la maladie à laquelle je souhaiterois, de préférence, appliquer l'électricité.

MÉMOIRE



M É M O I R E

Sur les effets généraux, la nature & l'usage du fluide électrique, considéré comme médicament.*

J'AI fait insérer dans le *Journal de Médecine* du mois d'avril 1778 & dans celui du mois de juin de la même année, 1°. une lettre sur les précautions nécessaires par rapport aux malades qu'on traite par l'électricité; 2°. une réponse à des observations critiques par M. l'abbé Sans, sur le même sujet. J'ai parlé de l'électricité dans ces deux opuscules comme d'un remède stimulant & apéritif, dont l'usage expose les malades aux mêmes risques, & requiert, pour les éviter, les mêmes précautions* que tous les médicamens qui ont les propriétés que je crois reconnoître dans l'électricité. J'ai cité les auteurs qui ont eu avant moi la même manière de penser, mais qui ne l'ont qu'indiquée, & au sentiment desquels il ne me paroît pas qu'on ait fait assez d'attention; je me suis engagé à confirmer ou à détruire cette opinion suivant les lumières que me fourniroient de nouvelles observations; elle a été confirmée par toutes celles que j'ai faites depuis.

Je pourrois donc me contenter de citer les lettres insérées dans le *Journal de médecine* & y renvoyer; mais mon opi-

* Inséré dans le second volume des *Mémoires de la Société Royale de Médecine*, page 432.

nion est fondée, quant à ce qui me concerne, sur les faits rapportés dans le Mémoire précédent ; il contient les preuves, & celui-ci les conséquences ; tous deux présentent donc sur le même sujet une suite de faits & de résultats que j'ai cru devoir réunir.

Effets généraux de l'électricité.

1°. L'ÉLECTRICITÉ positive accélère les pulsations du poulx, à peu près dans la proportion de 6 à 80.

Cet effet varie nécessairement du plus au moins suivant l'irritabilité du sujet, sa disposition particulière, la force de la machine électrique & l'état de l'atmosphère.

L'accélération du poulx par l'électricité positive, quoique reconnue par beaucoup de physiciens, étant niée par quelques uns, j'en citerai comme une preuve le fait suivant.

Dans l'été de 1777, par un temps sec & favorable à l'électricité, je choisis entre un assez grand nombre de personnes celle dont le poulx me parut, ainsi qu'à deux de mes confrères, battre le plus régulièrement : c'étoit un homme de trente ans environ, assez fortement constitué : il s'assit dans un fauteuil placé sur un isoloir, prit d'une main une baguette de cuivre en communication avec le premier conducteur, tandis que M. Daubenton, de l'académie des sciences & de la Société de médecine, placé sur un isoloir à côté, se chargea de lui toucher le poulx. Je tenois en même temps une montre qui marquoit les secondes, dont l'aiguille qui les indiquoit, s'arrêtoit ou continuoît son mouvement selon qu'on pressoit ou lâchoit une détente. Les choses ainsi préparées, & avant de faire tourner le plateau, au moment où M. Daubenton commença à compter les pulsations du poulx, je lâchai la détente & j'arrêtai M. Daubenton à l'instant où l'aiguille eut fait une révolution sur le cadran. Les pulsations montèrent à soixante-neuf dans une minute, de la durée précise de laquelle nous étions certains. Nous recommençâmes l'épreuve de la

même manière ; le résultat fut le même : nous fîmes tourner le plateau & nous comprâmes soixante-quatorze pulsations en une minute ; le nombre en fut égal dans un second essai ; on enleva la baguette de communication , & les pulsations ne montèrent qu'à soixante-neuf ; il y en eut de nouveau soixante-quatorze en une minute, après avoir rétabli la communication & fait tourner le plateau. Indépendamment de M. Daubenton déjà cité & de plusieurs autres personnes , M. Desmarets , de l'académie royale des sciences, & M. Thourer, de la société de médecine , étoient présens.

2°. L'électricité négative diminue le nombre des pulsations du poulx dans la proportion de 2 à 80.

Je ne le fais pas par ma propre expérience ; mais sur le récit d'un physicien qui a toujours passé pour très-véridique , & qui s'en étoit assuré par un grand nombre d'expériences faites sur lui-même , feu M. Dalibar.

3°. L'électricité augmente , & même assez considérablement, l'insensible transpiration. Entre les expériences probatoires sur ce fait, voyez celles qui ont été exécutées par M. l'abbé Nollet, & qui sont rapportées *pag. 366 & suiv.* du volume de ses œuvres intitulé *Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques.*

4°. Une électricité modérément forte & continuée quelque temps, ou excite la sueur pendant le temps même que les malades sont sur l'isoloir (*V. Mémoire précédent*, entre autres le n° IV), ou elle les dispose à suer facilement pour peu qu'ils agissent & lorsqu'ils sont dans leur lit, quoiqu'ils n'y soient pas plus couverts qu'à leur ordinaire. Ces deux effets ont également lieu en hiver comme en été (voyez entre-autres les n°s VII, XVI, LXV). Administrée avec les mêmes conditions, l'électricité provoque très-fréquemment la salivation (voy. les n°s II, VII, XVI, XIX, XXV, LIX, &c).

Lorsque l'électricité est très-forte, elle peut exciter une sueur & une salivation excessives. Deux personnes de pro-

vince ayant fait construire une très-grande machine, & soumis deux fois par jour un seul malade à son action pendant une heure chaque fois, elles mandoient, dans un Mémoire adressé à la société royale de médecine, que peu de temps après que le malade étoit sur l'isoloir, tout son corps se couvroit de sueur, & qu'il lui prenoit une salivation si abondante qu'il mouilloit plusieurs serviettes en une heure.

La salivation continuoit dans le même degré pendant toute la journée, & elle ne diminuoit que pendant le repos de la nuit. Y auroit-il des cas où cet effet excessif de la plus forte électricité pourroit être utile?

5°. Il arrive assez fréquemment que les malades qui sont électrisés, rendent des urines troubles & qui fournissent un dépôt abondant (voyez entre autres les n^{os} XV, XVI, XIX, XXV, XXXI, XXXIX).

6°. Quelques malades habituellement resserrés, d'autres qui n'évacuoient que par le moyen des lavemens, ayant été électrisés, ont eu le ventre libre, ou ont évacué naturellement (voyez les n^{os} XVI, XIX, &c. & les n^{os} VIII, XII, &c.)

MM. Nollet, de Laffone, Morand s'aperçurent, en administrant l'électricité à des malades aux Invalides, que ce remède excite la salivation; & M. Jallabert avoit remarqué que les commotions qu'il donnoit à un ferrurier qu'il a traité, lui occasionnoient souvent des diarrhées. Très-peu des malades que j'ai soignés en ont éprouvées; ce qui vient probablement de ce que je me suis fort peu servi des commotions; & que j'ai employé une électricité plus douce. Cependant MM. Linné & Zetzel assurent qu'un long usage de l'électricité rend le ventre paresseux : *omnibus sub usu electricitatis continuato, tarditas alvi*. Je n'ai pas eu jusqu'à présent d'occasion de faire cette observation, pas même par rapport aux malades n^{os} VII & XI, électrisés, l'un pendant cinq, l'autre pendant six mois.

7°. Des parties affectées de douleurs anciennes & habi-

tuelles en ont été délivrées par l'usage de l'électricité ; mais peu après de nouvelles douleurs se sont fait sentir dans des parties qui en avoient été exemptes jusqu'alors ; l'électricité expose donc les malades au danger des métastases (V. par rapport aux observations qui me sont particulières , les n^{os} ci-dessus , VIII , X , LIX , LXII ; & relativement à ce qui a été publié avant moi sur le danger des métastases de la part de l'électricité , ce qui est rapporté volume I , page 60 , 61 , 62 de la collection publiée par M. de Haller , sous le titre de *Disputationes ad morborum historiam & curationem facientes*. Il ne s'enfuit pas qu'il faille rejeter ni l'électricité , ni les remèdes qui , comme elle , exposent également au risque des métastases ; mais qu'en l'employant on doit se conduire comme en faisant usage de ces remèdes , se contenter des crises si elles sont suffisantes (ce qui m'a paru très-rare par rapport à l'électricité) , les soutenir & les favoriser par des accessoires convenables si elles sont trop foibles , y suppléer par les moyens propres aux cas différens , si elles n'ont pas lieu.

8°. Il est très-ordinaire que des membres affectés d'une sensation de froid habituelle & même invétérée , recouvrent le degré de chaleur naturel par le moyen de l'électricité (v. en particulier sur cet effet , qui a souffert peu d'exceptions , le n° LXIV).

9°. Des membres atrophies & décolorés ont repris de la chair & du coloris dans les malades n^{os} X , XVI , XXII , XXIX , LXVI ; dans d'autres malades qui avoient différentes parties tuméfiées , l'enflure a été diminuée ; cet effet a été fréquent & assez prompt. Enfin la sensibilité & le mouvement ont été ou rappelés , ou augmentés dans des parties ou qui en étoient privées , ou dans lesquelles ces facultés étoient plus ou moins diminuées (voyez en particulier les n^{os} IV , X , XVI , XX , XLV , LXXIII , &c).

10°. Des évacuations critiques , dont la suppression paroît avoir été l'origine du mal , ont été renouvelées pendant le traitement dans les malades n^{os} X , LXIII , LXIX.

11°. Les vésicatoires & les cautères ont plus rendu pendant le traitement qu'ils ne faisoient auparavant, & dans les jours où les malades ont été électrisés que dans les intervalles où ils ne l'ont pas été. Cet effet a sur-tout été sensible dans la malade n° LXVI, qui a souvent interrompu son traitement.

Tels m'ont jusqu'à présent paru être les effets sensibles que l'électricité produit à l'intérieur, & qui ont lieu très-souvent. Les malades ne les éprouvent pas tous à la fois; mais plus ils sont prompts à se manifester, plus ils sont considérables & soutenus, plus ils s'en trouvent de réunis dans le même sujet, plus il paroît que le soulagement est prompt, complet & durable. Ainsi le malade n° XVI, qui étoit très-incommodé, quia de bonne heure & tout à la fois & habituellement sué, salivé, rendu des urines troubles, & dont le ventre, antérieurement paresseux, étoit devenu très-libre, a obtenu un soulagement plus prompt qu'aucun autre; il a été très-considérable, & il se soutient très-bien jusqu'à présent.

Je n'ai pas encore remarqué que l'électricité ait produit dans ceux qui ont été soumis à son action, l'agitation que beaucoup de personnes redoutent de la part de ce remède. Les malades n°s VIII & XXXI, ont eu, au contraire, après leur traitement commencé & pendant sa durée, un sommeil plus calme & plus long. Les personnes dont les nerfs sont excessivement sensibles & fort agacés, qui éprouvent des symptômes dépendans de ces deux causes, n'ont paru jusqu'à présent les seules auxquelles l'électricité ait été contraire. Je crois que son usage continué dans le cas dont je parle, pourroit faire beaucoup de mal; mais l'ayant abandonnée aussi-tôt qu'on s'est aperçu de son effet contraire, il n'en a résulté aucun inconvénient (voyez les n°s XIII, XIV, LIV, LXIV).

C'est d'après les faits que je viens de rapporter, que j'ai observés en général, qui ont très-souvent lieu, que d'autres

avoient remarqués séparément avant moi & que j'ai réunis ; que je pense que l'électricité agit comme apéritive ; que je crois qu'elle expose au danger des méastafes ; qu'elle doit , par conséquent , être administrée avec prudence , & qu'elle requiert , pour la sûreté de ceux qui sont soumis à son action , l'œil d'un médecin vigilant. Cette proposition ne sera pas suspecte de la part d'un homme qui n'est pas médecin , dont les talens sont généralement reconnus , M. de Saussure : *Il exige toujours* (dit-il dans une lettre adressée à M. Gallatin , & dans laquelle il lui parle des traitemens électriques qu'il a suivis) *que le malade vienne accompagné d'un médecin.* Ce physicien , qui a traité long-temps avant moi des malades par l'électricité , qui l'a employée de la même manière , qui a eu la même façon de penser relativement à son action , dont les observations ont la plus grande conformité avec celles que j'ai faites , s'écrit que nous en ayons rien scu ni l'un ni l'autre que fort tard , m'écrit dans une lettre que j'ai entre les mains : *Il est effectivement bien remarquable que sans nous être jamais communiqué notre façon de penser sur l'électricité , nous nous soyons formé si précisément les mêmes idées de son action , de la manière de l'appliquer , des précautions & des remèdes coopérans qu'elle exige.*

C'est donc sur les effets que l'électricité produit à l'intérieur , que j'ai observés ainsi que M. de Saussure , qu'est fondée notre façon de penser sur son action , & que je lui crois une vertu apéritive , comme je pense qu'elle en a une stimulante , d'après les faits suivans qui se manifestent à l'extérieur :

1°. Lorsqu'on tire des étincelles d'une partie quelconque , les muscles qui en sont frappés & les muscles voisins entrent forcément en contraction : l'homme le plus fort ne peut pas résister à cet effet , qui est purement mécanique.

2°. Les étincelles font éprouver sur l'endroit qui en est frappé une sensation , qui tient à la fois de la piquure & de la brûlure ; & elles produisent dans les parties voisines un ébranlement qui se propage plus ou moins.

3°. Elles laissent communément sur la peau , à l'endroit qui a été atteint , des taches semblables à des morsures de puces ; elles y font quelquefois élever des ampoules , & en total les membres dont on a tiré beaucoup d'étincelles , offrent le même aspect que ceux qu'on a frottés avec des orties. Mais l'effet des étincelles est moins durable , les rougeurs & les ampoules disparaissent communément au bout de quelques heures , & elles ne sont pas douloureuses.

4°. Lorsque l'air est sec & que l'électricité est forte , les étincelles sont grosses , bruyantes , & leur éclat est purement lumineux ; mais lorsque l'air est humide & que l'électricité est foible , les étincelles sont petites , rougeâtres , & elles sont peu de bruit.

Les premières sont beaucoup moins douloureuses ; les malades s'y accoutument en fort peu de temps.

Les secondes sont presque insupportables ; leur effet ressemble à la piquure d'un aiguillon acéré qui pénétreroit fort avant & qui déchireroit les chairs : cependant elles excitent dans les muscles des contractions plus foibles , & elles laissent sur la peau des taches moins étendues & moins foncées.

5°. Il n'est point de parties dont on ne puisse tirer des étincelles , si ce n'est sous l'aisselle ; ce qui vient , à ce que je crois , de l'abondance de la transpiration. Je ne sais comment quelques personnes ont pu avancer qu'on ne tiroit pas d'étincelles des membres paralysés , ni des cadavres : l'expérience peut à chaque instant prouver le fait contraire. La seule différence que j'ai trouvée entre les membres paralysés & ceux qui ne le sont pas , ou qui ne le sont qu'à un certain degré , c'est que lorsque la paralysie est portée au plus haut point , les étincelles n'excitent pas de contraction musculaire. Je n'ai encore vu que deux malades dans ce cas ; mais je n'ai point rencontré jusqu'à présent de paralytiques , dont les membres malades ne fournissent des étincelles comme ceux des hommes sains. Si les parties sont atrophiées , les étincelles seront foibles , comme dans un homme sain les parties

parties grêles en fournissent de moins fortes que les parties qui sont plus musclées. Mais cet effet n'offre rien de plus étonnant que de ce qu'on tire de fortes étincelles d'un masse métallique & de très-petites d'un fil de la même substance ; l'un & l'autre dépend de la même cause. Je ne prétends pas qu'il n'y ait peut-être des cas de paralysie qui me sont inconnus, où l'on ne puisse pas tirer d'étincelles ; mais ils ne sont sûrement pas ordinaires, & l'on n'en sauroit certainement tirer une proposition générale.

De la manière d'employer l'Électricité.

CET article renfermera deux objets : je m'occuperai d'abord de l'emploi mécanique de l'électricité ; je parlerai ensuite des moyens & des remèdes concomitans dont il me paroît utile de faire usage en même temps.

Les physiciens firent les premières expériences électriques par le moyen d'un tube de verre qu'ils frotoient avec les mains ; en approchant ce tube ainsi électrisé d'un malade isolé, on l'électrisoit faiblement. M. Pivati, de l'institut de Bologne, enduisit intérieurement des tubes, en remplit d'autres de substances médicamenteuses ; il ferma hermétiquement les uns & les autres à leurs extrémités ; après les avoir ainsi préparés, il les électrisoit en les frottant & les approchoit des malades. Il adressa sur ce sujet à M. Zanotti une lettre qui a été rendue publique. M. Pivati y annonce que le fluide électrique entraîne avec lui les parties les plus subtiles des substances renfermées dans les tubes, & qu'à sa faveur ces molécules pénètrent avec lui les solides & les fluides les plus intimes des personnes qu'on électrise ; que leur transpiration, leurs membres, leurs cheveux, prennent, conservent & exhalent long-temps l'odeur des substances renfermées dans les tubes dont on s'est servi. C'est, suivant l'auteur, un moyen nouveau & heureux de porter intérieurement des topiques & de les faire pénétrer jusqu'aux parties

les plus profondes. La lettre contient les détails de plusieurs cures éclatantes, obtenues par ce procédé nouveau. Il fixa l'attention de tous les phyficiens ; mais les expériences qu'ils répétèrent en détruisirent la réalité, & le firent tomber dans l'oubli.

On substitua bientôt aux tubes, d'abord des cylindres, ensuite des globes qu'on fit tourner par le moyen d'une roue, & qu'on électrisoit en y appliquant les mains pendant la rotation, ou en les faisant frotter contre des coussins.

Les cylindres & les globes avoient l'inconvénient de se briser quelquefois & de se disperser en éclats, au grand risque des assistans, par l'explosion de l'air qu'ils renfermoient, & qui étoit raréfié par la chaleur que produisoient la rotation & le frottement.

On abandonna par cette raison les cylindres & les globes, aussi-tôt qu'on eut imaginé de poser à leur place entre les coussins un plateau de verre qui n'expose pas au même danger, & qui a en outre l'avantage d'être plus électrique, parce qu'il est frotté dans une surface plus étendue.

Un plateau destiné au service des malades, doit, autant qu'il est possible, fournir de suite & longtemps une électricité soutenue ; il la doit fournir tous les jours, quelque soit l'état de l'atmosphère.

On approche de ces deux conditions par le choix du plateau & l'état dans lequel on entretient la pièce où il est placé.

Après les verres d'Angleterre, ceux de la manufacture de Cherbourg sont les plus électriques ; les glaces soufflées sont bonnes en général, & celles qui sont coulées le sont rarement. C'est par cette raison qu'il est difficile de trouver un bon plateau dont le diamètre soit de plus de deux pieds, parce que les plus grandes glaces soufflées n'en ont pas davantage. Ce diamètre est celui du plateau dont je me suis servi & qui m'a suffi pour électriser quelquefois dix malades à la fois. Je crois qu'une glace de cette grandeur seroit souvent trop forte pour un seul malade.

Quant aux précautions nécessaires par rapport à la pièce dans laquelle on électrise, elles consistent à en entretenir l'air aussi sec qu'il est possible, à éviter tout ce qui peut le rendre humide; il est bon d'y placer un poêle qui ait en dedans de la pièce un long tuyau pour dessécher l'air humide pendant l'hiver; mais de quelque façon qu'on allume du feu, il faut bien prendre garde qu'il ne se répande pas de fumée dans la pièce; en se dispersant dans l'air & faisant office de conducteur, elle empêche tout isolement & détruit absolument l'électricité par cette raison.

Après le choix du plateau & l'attention de tenir bien sec l'air de la pièce où l'on électrise, on doit avoir égard au conducteur & aux baguettes de communication qui transmettent l'électricité aux malades. On fait ordinairement ces instrumens de cuivre jaune; le poli en doit être parfait, & on les termine par une boule, parce que le fluide électrique se dissipe en abondance, & se perd par tout ce qui fait pointe ou aspérité.

Si l'on a une machine trop foible, on en augmente la force par deux moyens; 1°. en attachant extérieurement à l'axe d'un des coullins un fil de fer qu'on dispose de façon qu'il sorte de la pièce, qu'il descende au rez-de-chaussée jusques sur le sol dans lequel on l'enfonce, ou l'on en conduit l'extrémité dans l'eau d'un puits, ce qui est encore mieux; ce fil tire du réservoir commun du fluide qu'il fournit au plateau.

2°. Outre le premier conducteur, qui est de métal, on en suspend d'autres au plancher; ils sont faits de carton & couverts de feuilles d'éraïn. C'est leur fabrique ordinaire; car on pourroit les faire autrement. Ils doivent être cylindriques, arrondis à leurs extrémités, & le plus unis qu'il est possible dans toute leur étendue; on les suspend par des cordons de soie pure, enfermés dans des tubes de verre qui garantissent les cordons de la poussière; elle feroit corps à la longue avec les cordons, & diminueroit la bonté de l'isolement.

Les ifoloirs sont les supports sur lesquels on place les sièges qui reçoivent les malades : on les fait du bois le plus sec, qu'on peint à l'huile ou qu'on enduit en dessous, soit d'un mélange de résine, de cire, de poix à parties égales, soit d'un vernis à la cire d'Espagne. Les bords des ifoloirs doivent être soigneusement arrondis & leurs surfaces bien polies. Pour en faire d'excellens, il faut faire sécher au four le bois qu'on y veut employer & le saturer en même temps d'huile de noix.

On se sert, pour former les pieds des ifoloirs, de colonnes de verre ou de bouteilles bien fortes qu'on a bien nêtoyées, bien desséchées en dedans & bouchées ensuite avec soin. On les attache aux ifoloirs par le moyen du mastic de plombier. On place sur les ifoloirs soit des sièges ordinaires, soit un banc sur lesquels les malades s'assient. Un banc est préférable dans les traitemens en grand, parce qu'on a soin dans sa fabrique d'éviter les angles & les aspérités, & qu'on le peint ainsi que l'ifoloir. Les malades étant assis, on leur fait tenir une longue baguette de cuivre bien polie, terminée par deux boules, à laquelle une autre baguette qui communique avec le conducteur de la machine apporte l'électricité.

L'excitateur est une baguette de cuivre d'un pied & demi ou deux pieds de long, terminée par une boule de la grosseur d'une très-petite noix, adaptée à un manche de verre. Entre le manche & l'origine de la baguette est un anneau, auquel on attache une chaîne qui sort de la pièce & qui communique en dehors. L'excitateur sert à tirer les étincelles qui se déchargent par la chaîne, sans que celui qui les tire les ressent, au moyen du manche de verre. Sans la chaîne qui sert à la décharge, l'excitateur s'électrifieroit & l'on ne tireroit pas d'étincelles.

Je me sert, pour en tirer des parties délicates, telles que le tour des yeux, le visage en général, d'une baguette de cuivre de deux à trois pieds de long, passée à travers un tube de verre, terminée à ses deux bouts hors du tube par des boules de cuivre qui y sont vissées. La personne qui tire les étin-

celles, tient le tube de la main gauche, pose une des boules sur la partie qu'on veut électriser, approche de la main droite l'excitateur de la boule placée hors du tube à l'autre extrémité. Par ce moyen les étincelles sont plus douces, effraient moins le malade, sujet autrement à se retirer, & dont les mouvemens sont souvent tomber les étincelles sur les parties qui ne doivent pas les recevoir.

J'emploie pour les sourds, d'après un professeur suédois, un fil de fer de six pouces de long, de la grosseur du tuyau d'une plume de corbeau, terminé à un bout par une pointe mousse, arrondie & polie, & retournée à l'autre bout en forme d'anneau ; au tiers du fil de fer du côté de l'anneau est adapté un bâton de cire d'Espagne. Le malade prend l'instrument par l'espèce de manche que forme la cire ; il en introduit la pointe dans son oreille & l'enfonce doucement jusqu'à ce qu'il la sente posée sur le tympan ; il soutient l'instrument avec sa main en tenant le manche. On tire les étincelles du bout recourbé en anneau.

L'inventeur de cet instrument y en substitue, pour le second temps du traitement, un semblable dont l'extrémité est seulement beaucoup plus grosse & plus arrondie ; & pour le troisième temps, un dernier instrument dont la pointe plus grosse & fendue dans son milieu est bifurquée ; je n'ai pas remarqué d'avantage à changer d'instrument ; & le premier m'a paru avoir le plus d'action : il fournit des étincelles plus vives.

La bouteille de Leyde sert à donner la commotion qui est proportionnée à la grandeur du vase qu'on emploie, à la charge qu'on lui fait prendre, à l'épaisseur du verre. Car, à parité de grandeur, une bouteille plus mince se charge davantage qu'une plus épaisse.

Enfin l'amalgame est un composé dont on enduit les couffins ; il donne plus de force à l'électricité & la relève quand elle s'affaiblit, soit qu'il contribue seulement à augmenter le frottement, soit qu'il fournisse du fluide que le plateau en soutire,

On fait une très-bonne amalgame en combinant trois parties d'étain & deux de mercure ; on triture ensuite cette amalgame & on la mêle dans un mortier de marbre ou de verre avec dix parties de craie. On réduit le tout en une poudre qu'on renferme dans une bouteille bien sèche ; car l'amalgame, ainsi que tout ce qui sert aux opérations électriques, doit être tenue dans l'état de dessiccation le plus parfait, puisque rien ne détruit l'électricité autant que l'humidité.

Avant d'employer l'amalgame, on frotte légèrement les coussins avec un peu de suif ; il sert à faire adhérer l'amalgame dont on saupoudre les coussins, & dont on frotte les deux surfaces l'une contre l'autre, pour rendre l'adhésion plus intime.

Tels sont les instrumens & les matières nécessaires pour électriser des malades de la manière dont la plupart des physiciens les traitent aujourd'hui.

Il résulte de l'emploi des instrumens dont je viens de parler, trois manières d'électriser.

1°. Lorsque les malades assis sur des sièges supportés par les isoloirs tiennent des baguettes de communication en contact avec le conducteur, & qu'on tourne le plateau sans faire d'autre opération ; alors les malades sont simplement électrisés, & plusieurs physiciens disent qu'ils le sont par bain ; ils sont alors en effet environnés de tous côtés par un atmosphère de fluide électrique, comme un homme qui prend un bain ordinaire, est environné d'eau.

2°. Les malades étant placés sur les isoloirs, si on approche de leurs membres & qu'on retire alternativement la boule de l'excitateur, ils sont alors électrisés par étincelles.

On peut demander, par rapport aux deux opérations précédentes, 1°. quel temps on y doit employer ; 2°. quelles précautions mécaniques elles exigent.

Je prie le lecteur de faire attention que je suis bien éloigné de prétendre dicter des loix ; que je dis seulement avec franchise & simplicité ce que j'ai pratiqué & ce qui m'a paru le mieux réussir.

J'ai toujours commencé par n'administrer que le bain seul, & je ne l'ai fait prendre pendant les deux ou trois premiers jours que durant dix minutes ou un quart-d'heure ; j'en ai prolongé ensuite graduellement la durée. Mon but a été d'accoutumer les malades à un appareil dont la plupart s'effraie, & de fonder les effets de l'électricité sur leur tempérament. Au bout de huit jours communément j'étends la durée du bain jusqu'à une heure ; je la porte à deux après quinze jours, & quelquefois jusqu'à trois par la suite. Ce sont l'âge, les forces, le tempérament du sujet, l'intensité de la maladie, son espèce qui doivent déterminer sur la durée du bain. Je ne l'ai guère employé qu'une fois par jour pendant le premier mois, & ensuite souvent deux fois. Les mêmes motifs doivent encore décider sur ce double emploi, comme ils doivent déterminer à ne porter le double bain par jour qu'à une ou à deux heures chaque fois. En général, il m'a paru plus avantageux de partager le bain en deux séances, l'une le matin, l'autre le soir, quelque durée qu'on lui donne.

Quant aux précautions qu'il requiert, il n'en exige pas d'autre que d'essuyer à chaque fois les supports des isolements, & d'être attentif à ce que rien ne rompe les isolements. Il faut, par rapport aux femmes, prendre garde que les pointes des épingles qu'elles portent, ne soient saillantes. Car alors elles occasionnent beaucoup de perte. A l'égard des malades qui viennent à pied, il faut leur faire prendre en entrant des chaussures sèches.

J'en ai communément commencé à employer les étincelles qu'au bout de cinq à six jours ; je les ai administrées d'abord pendant cinq à six minutes, & je les ai portées ensuite jusqu'à une demi-heure au plus soir & matin, lorsqu'il a fallu en tirer de tout un côté hémiplégique. Lorsqu'il n'a fallu en tirer que de quelque partie en particulier, comme d'un bras, ou d'une oreille pour un sourd, j'en y ai employé que dix minutes matin & soir.

Ce sont les symptômes qui décident du lieu d'où l'on doit

tirer les étincelles. Dans la paralysie, on doit toujours les tirer des muscles qui sont dans l'atonie, & éviter de toucher à ceux qui conservent toute leur force; si tous l'ont perdue, il faut tirer des étincelles de tous; s'il y a rétraction & flexion de quelque membre, il faut, en tirant les étincelles, suivre la ligne que décrit extérieurement la courbure, puisqu'elle dépend du relâchement des muscles de ce côté, qui sont entraînés par leurs antagonistes. Il m'a paru aussi qu'il étoit avantageux de suivre la direction des principaux troncs nerveux, de tirer des étincelles à leur origine & le long de l'épine.

Ces différentes opérations exigent que les membres soient mis à nud, ou simplement couverts d'un vêtement de toile qui joigne & colle bien sur la peau, quand la pudeur le demande.

Il suffit, pour tirer des étincelles, d'approcher & de retirer alternativement l'excitateur, de prendre garde que la chaîne de décharge ne touche à l'isoloir, & d'essuyer souvent l'excitateur lorsque le malade transpire ou qu'il sue beaucoup. Lorsque l'électricité est foible, on obtient de fortes étincelles en les tirant à de plus longs intervalles; quand elles sont fortes, on les affoiblit en les tirant plus précipitamment. En général, pour réussir dans cette opération, il faut approcher prestement & retirer de même la boule qui termine l'excitateur. Si l'on procède lentement, il s'établit un courant par lequel le fluide se dissipe sans produire d'étincelles.

Peut-être le bain suffiroit-il seul: il est des cas, tels que ceux où il s'agit seulement de diviser, dans lesquels on ne doit pas employer d'autre méthode; mais l'expérience m'a paru bien démontrer que les étincelles augmentent & accélèrent les effets dans les maladies où l'indication est de stimuler en même temps que de diviser.

3°. Il est difficile de donner une juste idée à ceux qui ne l'auroient pas, de la manière d'administrer la commotion, qui peut être totale ou partielle. Il faudroit y employer par

écrit

écrit beaucoup de temps, au lieu qu'un coup d'œil suffit pour se mettre au fait de cet objet. Ce qu'on peut dire en général, se réduit à ceci : la commotion est une opération dans laquelle la surface interne de la bouteille est électrisée positivement, & l'externe l'est négativement. Il y a donc rupture d'équilibre entre les deux surfaces ; le fluide attaché à l'interne & surabondant, tend à se porter où il manque ; mais l'air qui environne le crochet ou la tige saillante hors du goulot qui est en communication avec la surface interne, est un milieu qui ne convient pas au fluide électrique ; il demeure donc accumulé à l'intérieur. Cependant, si d'un côté on pose sur la surface externe l'extrémité d'un milieu convenable au fluide électrique, & qu'on en approche l'autre extrémité du crochet, ce milieu établissant une libre communication entre les deux surfaces, le fluide surabondant sur celle qui est interne, se porte précipitamment vers l'externe qui en manquoit, en traversant le milieu qui établit la communication, & ce milieu reçoit la commotion qui résulte du passage du fluide d'une surface à l'autre.

Tout l'art se réduit donc à disposer les choses de façon, si l'on veut donner la commotion générale, que tout le corps ou un membre, si on veut la donner partielle, fassent partie du milieu qui établit communication entre les deux surfaces de la bouteille. Cette opération bien compliquée, bien longue à détailler par écrit, est à l'œil la chose du monde la plus simple.

Ce qui mérite davantage de nous arrêter, est de savoir si l'on doit faire usage de la commotion, dans quels cas, & à quel degré de force ?

C'a été longtems la seule manière d'électrifier les malades. Le bruit que fit la découverte de la bouteille de Leyde, l'effet surprenant de cette expérience, la secousse dont elle agit les membres, la cure d'un paralytique publiée par M. Jallabert, qui l'avoit traité par la commotion, fixèrent au commencement tous les esprits sur ce seul objet. Mais on re-

f

connut par la suite que la commotion secoue trop violemment les malades, qu'elle leur cause de l'insomnie, des inquiétudes, de l'agitation, des angoisses; que les membres, qu'elle paroît rendre plus souples, n'en sont souvent après que plus roides. MM. de Sauvages, Linné & Zetzel furent des premiers à reconnoître ces inconvéniens & à en prévenir. La plupart des physiciens, sur-tout en France, ont donc changé de méthode & n'ont plus employé la commotion que dans des cas particuliers.

Plusieurs personnes s'en servent dès le commencement; dans la paralysie, lorsque l'atonie, l'affaîssement portés au plus haut degré rendent probable que les autres moyens employés seuls seroient insuffisans. On en peut encore faire usage, quand après un temps donné, le bain & les étincelles n'ont pas produit d'effet; enfin la commotion a été employée avec succès dans la goutte seréine; peut-être seroit-elle aussi utile dans certains cas de surdité?

Mais si cette opération doit toujours être faite avec ménagement, c'est sur-tout lorsque la commotion traverse le cerveau, comme la chose a lieu dans le traitement de la goutte seréine.

Je ne me suis jamais permis d'administrer que de légères commotions, & quand je les ai fait traverser le cerveau, j'ai toujours usé de la précaution suivante.

J'ai commencé par compter les tours du plateau pendant le temps employé à charger la bouteille; j'ai tiré ensuite l'étincelle avec un excitateur à deux branches; & jugeant de la force de la charge par l'éclat, le bruit, le volume de l'étincelle foudroyante, j'ai fait faire au plateau plus ou moins de tours pendant le temps que l'on chargeoit de nouveau la bouteille pour donner la commotion aux malades. J'ai compté les tours de plateau de chaque charge; par ce moyen j'ai toujours été assuré de ne pas excéder le degré de force auquel je voulois me borner. Souvent je n'ai fait faire au plateau qu'un tour & demi, & bien rarement au-delà de trois.

J'ai donné depuis quinze à vingt commotions de suite, & j'ai répété cette opération jusqu'à quatre fois par jour. Elle demande de l'attention, & l'on ne doit jamais confier à un aide, à moins d'en être très-sûr, une opération dont les effets sont si violens, quand la charge est forte.

Les trois moyens dont je viens de parler, le bain, les étincelles, la commotion, peuvent être mis tous trois en usage & de suite dans la même séance pour les mêmes malades; ils ne s'excluent point les uns les autres, & l'on a coutume au contraire de les réunir, sur-tout les deux premiers, qui sont employés dans le plus grand nombre de cas. Tandis qu'on tire des étincelles à un malade, les autres sont électrisés par bain en même temps.

Les détails précédens n'offrent rien que de très-connu; je n'y suis entré que parce que des médecins qui ne s'étoient pas adonnés à cette partie de la physique, qui desiroient administrer l'électricité à des malades, m'ont écrit des provinces pour me les demander; que ces objets purement mécaniques les arrêtoient dans leurs vues, & que plusieurs m'ont engagé à publier ces mêmes détails dans les Mémoires de la Société. Ils ne sont peut-être pas inutiles, parce qu'ils font connoître la manière dont j'ai employé l'électricité; ce qui étoit nécessaire pour en juger d'après les résultats que j'ai obtenus.

Des moyens & des remèdes auxiliaires.

M. DE HAEN avant & après les séances électriques, faisoit frotter les membres paralysés avec des linges ou de la flanelle imprégnés de la vapeur du carabé qu'on avoit projeté en poudre sur des charbons. Plusieurs physiciens suivent cet usage; je l'ai conseillé à des malades: ils employoient les frictions soit simples, soit avec la vapeur de carabé, le matin & le soir chez eux, la chose n'étant guère praticable dans le lieu où je les reçois. Je crois que les frictions peuvent avoir quelque utilité; je ne leur en ai cependant pas remarqué une bien décidée.

M. l'abbé Sans veut qu'une personne isolée frotte pendant le bain électrique avec des serviettes chaudes qu'on lui fournit, les membres paralysés du malade qu'on traite. S'il y a rétraction, ou flexion des membres, il veut qu'on les tienne élevés pendant l'électrification, par le moyen d'un appareil qu'il décrit, & qu'en même temps on les charge graduellement d'un poids dont la pesanteur, agissant en sens contraire de leur flexion, tende à les redresser. Je n'ai tenté cette méthode que pour une seule malade (n° X du mémoire précédent); l'élévation du bras a causé à cette femme des douleurs qui m'ont empêché de continuer. Je n'ai donc rien à dire ni pour, ni contre le conseil que donne M. l'abbé Sans.

Peut-être que si dans les cas d'une extrême atonie, on employoit en même temps l'électricité & les frictions avec la teinture de cantharide, ces deux moyens réunis auroient plus d'activité que lorsqu'on ne fait usage que de l'un des deux.

M. de Saussure est dans l'usage de faire passer, au sortir du bain électrique, les malades dans un lit bassiné, où ils restent une heure ou deux, & de leur faire prendre, en y entrant, un léger diaphorétique. Je crois cet usage excellent dans l'emploi d'un remède dont un des principaux effets est de porter à la peau, & d'augmenter la transpiration : mais je n'étois pas à même de pratiquer ce conseil utile ; je me suis donc borné à engager les malades à se bien vêtir, à ne sortir & s'exposer à l'air que quelque temps après la fin des séances, sur-tout dans les jours froids & humides, & à leur conseiller de prendre chez eux, le matin & le soir, un léger sudorifique. J'ai le plus souvent employé l'infusion de fleurs de sureau. Je ne doute pas que cet objet ne soit très-important, & que la différence dans les circonstances n'en apporte une très-grande dans les effets, entre les malades qui peuvent être traités chez eux, & ceux qui sont obligés de s'exposer à l'air en venant dans le lieu où ils sont électrisés, & en en sortant dans un mo-

ment où les pores sont fort ouverts. Combien ne seroit-il pas aussi à souhaiter qu'on fût à portée de veiller sur le régime, quoique l'électricité n'exige en général que celui qui est nécessaire à toutes les personnes cacochimes? Quel avantage n'y auroit-il pas à suivre & à observer de près les évacuations critiques? Combien le médecin en jugeroit-il plus sûrement, d'après son inspection, que sur le rapport qui lui en est fait? Qui osera dire quelles lumières & quels succès pourroient fournir ces conditions qu'il m'étoit impossible de remplir?

Quant aux remèdes internes qui peuvent concourir avec l'électricité, ils doivent tendre à soutenir les évacuations critiques qu'elle produit, & y suppléer si elles manquent. C'est d'après la nature, le principe de la maladie, d'après les évacuations critiques qui s'annoncent ou qui ont lieu, que le médecin prescrira les remèdes convenables. Je n'ai rien à dire sur cet objet, qui ne soit connu de tous mes confrères. Je remarquerai seulement qu'il m'a paru nécessaire, d'après une expérience constante, de purger promptement les malades, lorsqu'ils ont éprouvé un changement notable en bien, à moins que les évacuations critiques ne soient très-copieuses & très-soutenues; que dans tout autre cas, si l'on diffère d'évacuer, l'humeur déplacée & mise en mouvement, se porte sur des parties qu'elle n'avoit pas encore atteintes, ou se jette de nouveau sur celles qui en avoient déjà été affligées. Enfin l'électricité, si elle est utile réellement, m'ayant paru l'être le plus souvent dans des cas où il y a cacochimie plus ou moins avancée, congestion d'une humeur vicieuse, formée lentement & depuis long-temps, entretenue, soit par un vice local, soit par le défaut général & l'affaissement des forces vitales, je crois que le cautère seroit, dans beaucoup de cas, un remède auxiliaire très-avantageux, qu'il rendroit les effets de l'électricité plus considérables, & qu'il en assureroit la durée. Il seroit sur-tout de la plus grande nécessité, dans le cas où la maladie auroit évidemment, ou même très-probable-

ment pour cause, la métastase d'une humeur qui avoit produit une maladie antérieure.

Du pronostic.

Le pronostic consisteroit en deux articles : 1°. déterminer les cas dans lesquels l'électricité seroit utile, & annoncer d'après l'histoire de la maladie, d'après les symptômes qui ont eu lieu, ou qui existent au moment où les malades se présentent, d'après leur âge, leur sexe, leur tempérament, la date de leurs infirmités, les circonstances qui leur sont communes avec la plupart des malades attaqués des mêmes maux, ou celles qui leur sont particulières, ce qu'ils ont lieu d'espérer.

2°. Prévoir, d'après les premiers effets produits par l'électricité, ceux qui auroient lieu dans la suite.

Je me suis attaché, autant qu'il m'a été possible, soit d'après ma propre expérience, soit d'après celle des autres, à recueillir & à comparer des observations qui pussent mettre en état d'établir un pronostic. Mais cette partie de l'électricité médicale me paroît bien peu avancée, & peut-être nous manque-t-elle entièrement. Je sais que ce n'est pas le sentiment de plusieurs physiciens, qui pensent que dans bien des cas on peut prévoir ce qui arrivera; je l'ai cru comme eux dans les commencemens, & d'après leur rapport, que les premières expériences ont paru confirmer; mais ces mêmes expériences ont été si souvent contredites par la suite, que je crois pouvoir conclure que le pronostic est encore à découvrir, ou que ce qu'on en fait, se réduit à bien peu.

Si l'on s'en rapporte au raisonnement, & si l'électricité est en effet apéritive & stimulante, elle sera utile dans tous les cas où les indications seront d'atténuer les fluides; & d'augmenter le ton des solides; elle sera contre-indiquée dans les cas opposés.

Si l'on consulte l'expérience, il paroîtra d'après les faits

que l'électricité réussit sur-tout, & en effet, dans les circonstances indiquées dans l'article précédent ; il paroîtra encore que la paralysie est de toutes les maladies celle dans laquelle elle est suivie d'un succès plus fréquent & plus complet ; qu'elle réussit sur-tout lorsque la paralysie a pour cause, ou l'atonie des fibres, ou une congestion humorale ou l'un & l'autre à la fois ; qu'elle est aussi utile dans les affections chroniques qui ont eu pour cause la suppression de la transpiration, ou celle d'une évacuation qui étoit critique, & en même temps périodique ou habituelle, & enfin dans la suppression des règles, lorsqu'elle dépend de l'atonie des solides ou de l'épaississement des fluides. On pourra encore espérer d'en retirer de l'avantage dans le rhumatisme, soit simple, soit gouteux, dans les cas de lait épanché, dans la goutte sereine, dans certains cas de surdité qu'on ne peut encore spécifier, & peut-être enfin dans les affections scrophuleuses.

L'électricité sera nuisible, au contraire, toutes les fois qu'il y aura trop de tension dans les solides, que les nerfs seront excessivement sensibles & irritables, qu'il existera des mouvemens spasmodiques idyopathiques ; lorsqu'il y aura dissolution ou tendance à ce vice dans les fluides.

Quant aux cas particuliers du sexe, de l'âge, du tempérament, de la date de la maladie, je ne crois pas qu'on puisse rien spécifier, puisque des femmes & des hommes, des enfans & des vieillards, des gens malades depuis longtemps, & d'autres qui l'étoient depuis peu, ont été à peu près également soulagés. On ne peut rien avancer à cet égard que de vague & de général, & qui ne convienne aux autres remèdes comme à l'électricité. Ainsi les adolescents en général, les gens incommodés depuis peu, ceux qui le sont légèrement, auront plus d'espérance que les autres.

Si l'on peut spécifier quelque chose, c'est peut-être par rapport aux paralytiques : ils me semblent avoir d'autant moins à espérer, que leurs idées sont moins nettes, &

que les organes de la voix sont plus embarrassés. Mais ces observations mêmes n'offrent rien de particulier à l'électricité, & elles ne peuvent être générales, puisque les nos VIII & XXXVIII, entre autres du Mémoire précédent, en fournissent des exceptions.

Enfin les douleurs qui se font sentir dans les membres paralysés, quelques jours après le traitement commencé ; & les autres effets qui ont lieu, n'annoncent pas ceux qui suivront, comme plusieurs physiciens le croient ; puisque plusieurs malades qui n'ont pas ressenti ces effets, ont été soulagés également comme ceux qui les ont éprouvés, & que le nombre a été à peu près égal des deux côtés.

Mais les crises ou les évacuations commencées de bonne heure, abondantes, soutenues, m'ont en général paru annoncer un succès plus prompt, plus complet. Cette observation même a cependant souffert quelques exceptions. C'est donc avec raison que je finis par conclure que le pronostic est une partie de l'électricité médicale ou à découvrir, ou qui est infiniment peu avancée, & qu'en général il reste beaucoup à faire & à observer, relativement à l'électricité considérée comme médicament.

On ne s'est jusqu'à présent occupé que de la positive ; il y a long-temps que j'ai dessein d'appliquer la négative au traitement des malades ; ses effets physiques étant l'opposé de ceux que produit l'électricité positive, il y a quelque probabilité que la négative pourroit être utile dans les cas où la positive est contraire. J'ai fait construire une machine nécessaire pour m'en assurer par l'expérience. J'en parle par deux motifs ; 1°. pour engager mes confrères à m'adresser des malades qui, atteints d'affections nerveuses, & auxquels l'électricité positive seroit très-nuisible, essaient avec moi les effets que la négative pourra produire ; genre de tentative dont il ne peut pas, en se conduisant prudemment, résulter plus d'inconvéniens que du premier usage qu'on a fait de l'électricité positive.